О гелиосферных характеристиках в коротяирующих областях взаимодействия СВ для моделирования поведения ГКЛ

Краинев¹ М., Базилевская¹ Г., Калинин¹ М., Свиржевская¹ А., Свиржевский¹ Н., Luo² Xi, Shen³ Fang, Aslam² O.P.M., Ngoben^{4,5} M.D., Potgieter⁶ M.S.

¹Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

²Shandong Institute of Advanced Technology (SDIAT), Jinan, Shandong, China

³State Key Laboratory of Space Weather, National Space Science Center, CAS, Beijing, China

⁴Centre for Space Research, North-West University, Potchefstroom, South Africa

⁵School of Physical and Chemical Sciences, North-West University, Mmabatho, South Africa

⁶Institute for Experimental and Applied Physics, Christian Albrechts University, Kiel, Germany

План доклада:

- Влияние коротяирующих областей взаимодействия (КОВ) на свойства гелиосферы: прямые наблюдения
- Влияние КОВ по МГД-расчётам
- Модели КОВ изучения для долговременных вариаций ГКЛ

Что такое коротационная область взаимодействия (КОВ, CIR) и почему 27-д вариации?

$$B_r(r, \theta, \phi) = B(\theta, \phi_0) \left(\frac{b}{r}\right)^2,$$

$$B_\theta(r, \theta, \phi) = 0,$$

$$B_\phi(r, \theta, \phi) = B(\theta, \phi_0) \left(\frac{\omega}{v_m}\right) (r - b) \left(\frac{b}{r}\right)^2 \sin \theta.$$

Parker, ApJ, 128, 664, 1958

Belcher & Davis., JGR, 1971

Важность КОВ для распространения ГКЛ: Ulysses

Важность КОВ для распространения ГКЛ: Voyager 1-2

3D Stat МГД модели КОВ для симуляции ГКЛ

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0,$$

$$\frac{\partial \rho \mathbf{V}}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(P + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) \mathbf{I} + \rho \mathbf{V} \mathbf{V} - \frac{B \mathbf{B}}{\mu_0} \right] = -\frac{\rho G M_s}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} + \mathbf{V} \cdot \mathbf{f},$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{V} \mathbf{B} - \mathbf{B} \mathbf{V}) = 0,$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = -(\gamma - 1) P \nabla \cdot \mathbf{V}.$$

Вращающаяся система:

$$\mathbf{f}_{\text{кор}} = -2\rho \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} - \rho \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$$

Упрощённые граничные условия

Реальные граничные условия

Pizzo, ...1990s; Kota, Jokipii, ...1990s

Wiengarten et al., ApJ, 2014;

Guo, Florinski, JGR, 2014;

Kopp et al., ApJ, 2017

Guo, Florinski, ApJ, 2016

Shen et al., ApJ, 2018;

Luo et al., ApJ, 2020

Квазистационарные периоды времени. CR2066 (2008.1-2)

CR2066 (2008.1), V_r и B_r : внутренняя граница

$$V_r^{\text{HCS}} = 302 \pm 6 \text{ km/s}$$

$$|B_r| = 80 \pm 8 \text{ nT}$$

$$\alpha_{qt} = 28.1^\circ \quad \lambda_{me} = -8.5^\circ$$

CR2066 (2008.1), V_r и B_r : наружная граница

$$V_r^{\text{HCS}} = \pm \text{ km/s}$$

$$\partial V_r / \partial \phi \ll \partial V_r / \partial \lambda$$

$$|B_r| = 0.003 \pm 0.002 \text{ nT}$$

$$\alpha_{qt} = 4.4^\circ \quad \lambda_{me} = 10.7^\circ$$

К объяснению скачков в ГТС: от $r=10.46$ а.е. к $r=10.77$ а.е.

Исчезает часть ГТС: сильно изменяются α_{qt} и λ_{me}
Островок с $B_r < 0$ тоже исчезает к $r=20$ а.е.

Влияние КВМ по сравнению с паркеровским ГМП:

1. Среднее по долготе $\Delta V(r, \lambda) = (\langle V^{\text{mhd}} \rangle_{\phi} - V^{\text{Par}}) / V^{\text{Par}}$

Влияние КВМ по сравнению с паркеровским ГМП:

2. На трёх сферах $\Delta B(\lambda, \phi) = (B^{\text{MHD}} - B^{\text{Par}}) / B^{\text{Par}}$

$\Delta_{\text{Par}}^{\text{MHD}} = (B^{\text{MHD}} - B^{\text{Par}}) / B^{\text{Par}} * 100\%$ on 3 Spheres, CR2066/01-02.2008

Влияние КВМ по сравнению с паркеровским ГМП:

3. На наружной границе $\Delta B(\lambda, \phi) = (B^{\text{mhd}} - B^{\text{Par}}) / B^{\text{Par}}$

Упрощённые граничные условия.

1. Магнитная и вращательная системы координат

Упрощённые граничные условия.

2. Скорость СВ в двух системах координат

Выводы

- Влияние КВМ на крупномасштабные свойства гелиосферы существенно (но выводы - косвенны!) по прямым наблюдениям:
 - зависимость V_r от r в зоне секторной структуры ГМП;
 - зависимость характеристик спектра неоднородностей ГМП от широты λ и r ,
- Влияние КВМ на крупномасштабные свойства гелиосферы существенно и по МГД-расчётам КВМ:
 - изменение $V_r(\lambda, \varphi)$ за областью CIR (форма и положение ГТС, $|V_r|(\lambda, \varphi)$)
- Для учёта влияния КВМ на долговременные вариации интенсивности ГКЛ можно учесть усиление/ослабление ГМП по сравнению с паркеровским ГМП
- Для изучения этого влияния, видимо, лучше подходит МГД-симуляция с упрощёнными граничными условиями